Groupe Excellence

Excellez avec les meilleurs professeurs !

Matière : Mathématique	Série 3 : GENERALITES	Professeur : M. Maïssa Fall
Groupe Excellence (cours en ligne)	SUR LES FONCTIONS	Niveau : 1S1

Exercice 1 :

Déterminer l'ensemble de définition de f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ tel que

a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x^2(1-x^2)}}$ b) $f(x) = \frac{\sqrt{\pi^2 - x^2}}{\sin x}$ c) $f(x) = \sqrt{\sqrt{x^2 + x} - 2}$ d) $f(x) = \sqrt{E(x) - x}$

f) $f(x) = \sqrt{-2x^2 - 14x - 5}$ si $x \leq 1$ f) $f(x) = \frac{1 + \sqrt{-x}}{1 - \sqrt{-x}}$ h) $f(x) = \frac{1}{|x| - 2}$

i) $\begin{cases} f(x) = x - 3 & \text{si } x \leq -1 \\ f(x) = 2x^2 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$ j) $f(x) = \frac{5x+2}{\sqrt{-x}}$ k) $f(x) = \frac{7x+5}{x^3 - 2x + 3}$

l) $f(x) = \sqrt{\sqrt{x^2 + x} - 2}$ m) $f(x) = \frac{\sqrt{3x^2 - x - 2}}{x^2 + x - 2}$ n) $f(x) = \frac{3x-6}{|x| - x}$;

o) $f(x) = \sqrt{\frac{x+3}{-x+5}}$; p) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - E(x)}}$

Exercice 2 :

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ vérifie $3f(-x) + f(x) = 4x^3 + 2x$.

Montrer que f est impaire. En déduire $f(x)$

Exercice 3 :

Montrer que toute fonction définie sur un intervalle du type $]-a; a[$ où $a \in [0; +\infty[$, est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

Exercice 4 :

Soit f une fonction telle que pour tout réel x on ait : $f(x+2) = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}$. Calculer $f(x+4)$;

$f(x+6)$ et $f(x+8)$. Que peut-on en conclure ?

Groupe Excellence

Excellez avec les meilleurs professeurs !

Exercice 5 :

Soit $f(x) = E[x - 2E(\frac{x}{2})]$

- Montrer que 2 est une période de f
- Étudier f sur $[0 ; 2]$
- Représenter graphiquement la fonction f sur $[-4 ; 4]$

Exercice 6 :

Même question qu'à l'exercice précédent avec la fonction $f(x) = (-1)^{E(x)}[x - E(x) - 0,5] + 0,5$.

Exercice 7 :

Représenter graphiquement la fonction f telle $f(x) = \frac{1}{E(x + E(-x))}$

Exercice 8 :

Soit $d(x, Z)$ la distance de x à l'entier le plus proche

- Calculer $d(0,75 ; Z)$; $d(8/3 ; Z)$; $d(\sqrt{2} ; Z)$
- Étudier et représenter la fonction g telle que $g(x) = d(x ; Z)$

Exercice 9 :

Déterminer l'ensemble de définition de f et g lorsque :

$$g(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2} \quad \text{et} \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

Exercice 10 :

Soient f et g 2 fonctions définies sur une même partie E de $\mathbb{R}$. Montrer que :

$$\text{Sup.}(f;g) = \frac{(f+g) + |f-g|}{2} \quad \text{et} \quad \text{Inf.}(f;g) = \frac{(f+g) - |f-g|}{2}$$

Exercice 11 :

Soit $f(x) = |x - 2|$. Parmi les fonctions suivantes de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, déterminer celles qui sont égales à f .

$$\text{a) } g(x) = \frac{|6x - 12|}{6} \quad \text{b) } h(x) = \frac{(x-2)^2}{|x-2|} \quad \text{c) } k(x) = \left| \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} \right| \quad \text{d) } l(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4}$$

Groupe Excellence

Excellez avec les meilleurs professeurs !

Exercice 12 :

Dire si chacune des fonctions suivantes est ou non une application de I dans IR.

a) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+2x-3}$ I = $[0, +\infty[$ b) $f(x) = \sqrt{x}$ I = IR

c) $f(x) = \left| \frac{x}{x-1} \right|$ I = $\mathbb{R}_+$ d) $f(x) = \frac{1}{4-x^2}$ I = $[0, 2]$

e) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ où $f(x) = |x|$ f) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ où $g(x) = x - \sqrt{x}$

g) $h: [2; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ où $h(x) = \sqrt{x-2}$ h) $k: [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ où $k(x) = \frac{1}{x-1}$

Exercice 13 :

On considère les applications suivantes de $\mathbb{R} - \{0; 1\}$ vers lui-même :

$$f_1(x) = x; f_2(x) = 1 - x; f_3(x) = \frac{1}{x}; f_4(x) = \frac{x}{x-1}; f_5(x) = \frac{x-1}{x}; f_6(x) = \frac{1}{1-x}$$

Démontrer que ces six applications sont bijectives et déterminer leurs bijections réciproques.

Exercice 14 :

- 1) Soit f la fonction définie sur $I = [-2; 4]$ par $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$
 - a) Trouver les réels a et b tels que $\forall x \in I f(x) = a + \frac{b}{x+3}$
 - b) Étudier le sens de variation de f sur I
 - c) Montrer que f est bornée sur I
 - d) Tracer dans un repère orthonormé, la courbe (C_f) représentative de
- 2) Soit g la fonction définie sur $J = [-5; 1]$ par $g(x) = \frac{3x+1}{2-x}$
 - a) Trouver les réels α et β tels que $\forall x \in I f(x) = \alpha + \frac{\beta}{2-x}$
 - b) Étudier le sens de variation de g sur J et montrer que g est borné sur J
 - c) Tracer sur le même graphique la courbe (C_g) de g
- 3) Montrer que $g \circ f$ est définie sur I et calculer $(g \circ f)(x)$
- 4) De même vérifier que $f \circ g$ est définie sur J et calculer $(f \circ g)(x)$
- 5) Tracer sur le même graphique la droite (D) : $y = x$. Observer alors la position de (C_f) et de (C_g) par rapport à (D)

Groupe Excellence

Excellez avec les meilleurs professeurs !

Exercice 15 :

Soit f et g deux fonctions strictement monotones, I un intervalle inclus dans D_f et J un intervalle inclus dans D_g , tels que pour tout x dans I $f(x)$ soit dans J . Dans ces conditions montrer que :

- 1) Lorsque f et g ont même sens de variation, alors $g \circ f$ est strictement croissante sur I .
- 2) Lorsque f et g ont des sens de variations différentes, alors $g \circ f$ est strictement décroissante sur I .

Exercice 16 :

Soit f et g définies de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x}{|x| + 1} \text{ et } g(x) = \sqrt{x - E(x)} \text{ où } E(x) \text{ désigne la fonction partie entière}$$

- 1) Déterminer les ensembles de définitions de f et de g
- 2) a) Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}$ on a : $x - |x| - 1 \leq 0$ et que $x + |x| + 1 \geq 0$ puis en déduire que f est bornée sur $\mathbb{R}$
b) montrer que g est bornée sur $\mathbb{R}$
- 3) a) montrer que f est bijective de $\mathbb{R}$ sur $] -1; 1[$ et déterminer f^{-1}
b) g est-elle bijective de $\mathbb{R}$ sur $[0; 1[$? (on vérifiera que $E(x+p) = E(x) + p \forall p \in \mathbb{Z}$)
- 4) a) Définir de manière précise les restrictions de $g \circ f$ sur les intervalles $[-2; 0]$ et $[0; 2[$
b) définir les restrictions de $f \circ g$ sur les intervalles $[-2; -1]; [-1; 0]; [0; 1]$ et $[1; 2[$

Exercice 17 :

Soit f et g définies de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^4 + 1}$ et $g(x) = x^2$

- 1) Déterminer les ensembles de définitions de f et de g puis comparer f et g
- 2) a) Montrer que $\forall x > 0 : f(x) - g(x) \leq \frac{1}{2x^2}$
b) Montrer qu'il existe un polynôme P du troisième degré tel que : $f(x) - f(1) = \frac{(x-1)P(x)}{\sqrt{x^4+1} + \sqrt{2}}$
- c) Montrer que $\forall x \in [0; 2]$ on a : $1 \leq P(x) \leq 15$ et $\sqrt{x^4+1} + \sqrt{2} \geq 2$
- d) En déduire que $\forall x \in [0; 2]$ on a : $|f(x) - f(1)| \leq \frac{15}{2}|x-1|$

Groupe Excellence

Excellez avec les meilleurs professeurs !

Exercice 18 :

Soit f la fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = E(x) - 2E\left(\frac{x}{2}\right)$

- 1) Donner, sans employer le symbole E , les expressions de $f(x)$ sur le segment $[0; 2]$
- 2) Montrer que f est périodique et construire sa courbe dans un repère orthonormé $(0; \vec{i}; \vec{j})$
- 3) Soit h une fonction définie sur un intervalle $[-a; a]$. Etudier la parité des fonctions p et i définies par:

$$p(x) = \frac{h(x) + h(-x)}{2} \text{ et } i(x) = \frac{h(x) - h(-x)}{2}$$

Prouver qu'il existe une fonction paire et une seule p , et une fonction impaire et une seule i telles que $h(x) = p(x) + i(x)$

Application : calculer p et i pour $h(x) = \frac{-2x+3}{x^2+5}$

Exercice 19 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x^2 + 1}}$

- 1) Déterminer D_f
- 2) Montrer que $\forall x \in D_f$ on a $f(-x) = \frac{1}{f(x)}$
- 3) Etudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+$ et sur $\mathbb{R}_-$
- 4) Soit g la restriction de f à $\mathbb{R}_+$. Montrer que g est bijective de $\mathbb{R}_+$ vers $[1; +\infty[$ et déterminer g^{-1}

Exercice 20 :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{1}{x+1} \sqrt{x^2 + 1}$

- 1) Déterminer D_f
- 2) Soit g définie par $g(x) = (f(x))^2$. Etudier les variations de g puis celle de f

Exercice 21 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$

- 1) Montrer que : $-1 < f(x) < 1 \forall x \in \mathbb{R}$
- 2) Montrer que -1 et 1 ne sont pas des extrémums de f .

Groupe Excellence

Excellez avec les meilleurs professeurs !

Exercice 22 :

Sur $]0; 1[$ $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{1-x}\right)$

- 1) Montrer que $\forall x \in]0; 1[$ $f(x) = 1 - \frac{2}{x^2 - x}$
- 2) Étudier les variations de f sur $]0, \frac{1}{2}[$ et sur $]\frac{1}{2}; 1[$
- 3) Quelle est la valeur maximale que prend $A = \left(1 + \frac{1}{a}\right) \left(1 + \frac{1}{b}\right)$ lorsque a et b décrivent $\mathbb{R}^+$ et vérifient $a + b = 1$?

Exercice 23 :

Sur $[1; +\infty[$ $f(x) = x - 1 - 2\sqrt{x-1}$

- 1) Déterminer $A = f^{-1}\left(\left\{-\frac{1}{2}\right\}\right)$ et en déduire que f n'est pas injective.
- 2) Soit $u(x) = x^2 - 2x$ et $v(x) = \sqrt{x-1}$
 - a) Montrer que $\forall x \in [1; +\infty[$ $f(x) = (u \circ v)(x)$
 - b) Étudier les variations de f
 - c) En déduire que f n'est pas injective de $[1; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$
- 3) Déterminer le maximum absolu de la fonction $g(x) = \frac{1}{x}(1 - 2\sqrt{x-x^2}) - 1$ sur $\left[\frac{2}{5}; \frac{1}{2}\right]$

Exercice 24 : Concours Général 2006

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$, continue et vérifiant la relation (1) suivante :

$$(1) : f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y) \text{ quels que soient } x \text{ et } y \text{ appartenant à } \mathbb{R}$$

- 1) Déterminer les fonctions constantes vérifiant (1). On suppose, dans la suite, que f est différente de ces fonctions.
- 2) Déterminer $f(0)$ et étudier la parité de f . Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- 3) On suppose que f admet une racine α .
 - a) Montrer que $\Omega(\alpha; 0)$ est un centre de symétrie de la courbe représentative de f
 - b) En déduire que 4α est une période de f .

Groupe Excellence

Excellez avec les meilleurs professeurs !

c) Montrer que $f(4\alpha) = 1$.

d) Montrer que si b est une période de f alors $f(b) = 1$.

e) Réciproquement, soit b une période de f . Étudier $f\left(\frac{b}{2}\right)$ et montrer que si $\frac{b}{2}$ n'est pas une période de f , on a : $f\left(\frac{b}{4}\right) = 0$.