

Groupe Excellence



Excellez avec les meilleurs professeurs !

Matière : Mathématique	Polynômes et fractions rationnelles	Professeur : M. Sarr
Groupe Excellence (cours en ligne)		Niveau : 2 nd S

Exercice 1 :

On considère l'expression $f(x) = (x + \sqrt{1 + x^2})^3 + (x - \sqrt{1 + x^2})^3$.

- 1) Vérifier que pour tous réels a et b on a : $(a + b)^3 + (a - b)^3 = 2a^3 + 6ab^2$.
- 2) En déduire que $f(x)$ est un polynôme dont on précisera le degré.
- 3) Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $f(x) = 0$.

Exercice 2 :

- 1) Déterminer le polynôme $f(x)$ du troisième degré tel que :

$$f(0) = 2; f(-1) = 8; f(1) = 0 \text{ et } f(2) = 8.$$

- 2) Dans chacun des cas suivants, déterminer (si possible) les réels a , b et c pour que les polynômes

$P(x)$ et $Q(x)$ soient égaux :

- a) $P(x) = 2x^2 + x - 3$ et $Q(x) = (x + 1)(ax + b) + c$.
- b) $P(x) = x^3 - 2x^2 - x - 8$ et $Q(x) = (x + 1)(ax^2 + bx + c)$.

Exercice 3 :

Soit $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 7x + 12$.

- 1) Montrer que f est factorisable par $(x - 3)$.
- 2) Factoriser $f(x)$:
 - a) Par la méthode d'identification des coefficients.
 - b) Par la méthode de la division euclidienne.
 - c) Par la méthode de Hörner.
- 3) Trouver les racines réelles de f .
- 4) Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation $f(x) \geq 0$.

Exercice 4 :

Groupe Excellence



Excellez avec les meilleurs professeurs !

1) Etudier le signe : $\frac{x+1}{4-3x-2x^2}$.

2) Soit $Q(x) = \frac{3x^3-6x^2+x+2}{x-3}$.

a) Etudier le signe de $Q(x)$.

b) En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation $Q(x) \geq 0$.

c) Quel est le signe de $Q(11)$, de $Q(\frac{11}{12})$ et de $Q(-\frac{6}{7})$?

Exercice 5 :

Soit P le polynôme défini par : $P(x) = -x^3 + 7x - 6$.

1) Montrer que 1 est solution de l'équation : $P(x) = 0$.

2) En déduire que $P(x)$ peut s'écrire sous la forme :

$P(x) = (x - 1)(-x^2 + ax + b)$, où a et b sont des nombres réels à préciser.

3) Résoudre dans \mathbb{R} l'équation : $P(x) = 0$.

4) Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation : $P(x) < 0$.

Exercice 6 :

On considère le polynôme P défini par : $P(x) = -x^4 + 4x^3 + x^2 - 16x + 12$.

1) Montrer que 3 et -2 sont des racines de P .

2) En déduire qu'il existe un polynôme Q tel que : $P(x) = (x^2 - x - 6)Q(x)$.

3) Déterminer le polynôme Q .

4) Résoudre dans \mathbb{R} l'équation : $-x^4 + 4x^3 + x^2 - 16x + 12 = 0$.

En déduire les solutions de l'équation : $-\left(\frac{x-1}{x}\right)^4 + 4\left(\frac{x-1}{x}\right)^3 + \left(\frac{x-1}{x}\right)^2 - 16\left(\frac{x-1}{x}\right) + 12 = 0$.

5) Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation : $-x^4 + 4x^3 + x^2 - 16x + 12 < 0$.

Exercice 7 :

A) 1) Démontrer que le polynôme P défini par $P(x) = x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x + 1$ est le carré d'un


polynôme $Q(x)$ à déterminer.

2) Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $P(x) = 0$.

B) 1) Déterminer le réel a pour que l'on puisse mettre $(x + 2)$ en facteur dans le polynôme

$$F(x) = 2x^3 + 12x^2 + ax - 84.$$

Groupe Excellence



Excellez avec les meilleurs professeurs !

- 2) Factoriser le polynôme $F(x)$.
- 3) Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation $F(x) \leq 0$.

Exercice 8 :

- 1) Factoriser le trinôme $x^2 - x - 12$.

- 2) Déterminer les réels a et b pour que le polynôme

$f(x) = 2x^4 - 4x^3 - 33x^2 + ax + b$ soit divisible par le trinôme $x^2 - x - 12$.

- 3) a et b étant les valeurs trouvées au 2), résoudre dans \mathbb{R} :

a) l'équation $f(x) = 0$;

b) l'inéquation $f(x) \geq 0$.

Exercice 9 :

Soit P le polynôme défini par $P(x) = x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 5x + 1$.

- 1) a) Montrer que 0 n'est pas racine de P .

b) Montrer que $P(x) = x^2 \left[\left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - 5 \left(x + \frac{1}{x} \right) + 4 \right]$. Indication : Calculer $\left(x + \frac{1}{x} \right)^2$.

- 2) En posant $U = x + \frac{1}{x}$.

a) Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $U^2 - 5U + 4 = 0$.

b) En déduire la résolution dans \mathbb{R} de l'équation $P(x) = 0$.

Exercice 10 :

Déterminer un polynôme P à coefficients entiers, tel que $P(a) = 0$.

- 1) quand $a = \sqrt{2} + \sqrt{5}$.

- 2) quand $a = \sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{5}$.

Exercice 11 :

On considère le polynôme : $20x^3 - 5x^2 - 3x + 2$. Il a trois racines a, b et c .

Sans calculer ces racines, déterminer :

$$a + b + c; \quad abc; \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}; \quad (a + b + c)^2; \quad a^2 + b^2 + c^2; \quad \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

Exercice 12 :

Groupe Excellence



Excellez avec les meilleurs professeurs !

1) Trouver tous les polynômes P de degré 2 tels que, pour tout réel x , $P(x + 1) - P(x) = x$.

En déduire la somme $1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1) + n$ des n premiers entiers naturels non nuls.

2) Trouver tous les polynômes P de degré 3 tels que, pour tout réel x , $P(x + 1) - P(x) = x^2$.

En déduire la somme $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (n - 1)^2 + n^2$, n étant un entier naturel

Exercice 13 :

1) Déterminer les réels, a , b et c tels que, pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$: $\frac{-2x^2-x+11}{x+2} = ax + b + \frac{c}{x+2}$.

2) Montrer qu'il est possible de déterminer trois réels a , b et c tels que, pour tout x élément de

$\mathbb{R}^* \setminus \{1; 2\}$, on ait : $\frac{9x^2-16x+4}{x^3-3x^2+2x} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x-2}$.

Exercice 14 :

P est le polynôme $x \mapsto 3x^3 - x^2 - 6x + 2$.

1) Calculer $P\left(\frac{1}{3}\right)$.

2) Factoriser $P(x)$, puis résoudre l'équation : $P(x) = 0$.

3) On pose $h(x) = \frac{3x-1}{P(x)}$.

Déterminer le domaine d'existence de h , puis résoudre l'inéquation $h(x) \geq 0$.

Exercice 15 :

Soit le polynôme P définie par : $P(x) = 6x^3 - x^2 - 32x + 20$.

1) Calculer $P(2)$ et factoriser $P(x)$.

2) Soit la fraction rationnelle f définie par : $f(x) = \frac{6x^3-x^2-32x+20}{9x^2-4}$.

a) Déterminer les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ existe.

b) Simplifier $f(x)$.

c) Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation $f(x) \leq -20$.